

Benign Prostat Hiperplazisinde (BPH) Kullanılan İlaçlar

Etken Madde	Geri Ödeme Durumu	UYARI	
Alfuzosin (Alfutu, Xalfu, Xatral)	Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Benign Prostat Hiperplazisi tedavisinde)	Bu gruptaki ilaçlar (Alfuzosin (Alfutu, Xalfu, Xatral), Tamsulosin (Floprost, Tamidra, Tamprost, Uromax), Terazosin (Hytrin, Teranar), Doksazosin, Sildosin (Urorec)) BPH teşhisiyle kombine kullanımda <u>ÖDENMEMEKTEDİR.</u> (Hipertansiyon tedavisinde kombine kullanımı ödenir.) <u>MEDULA SİSTEMİ HENÜZ KURGULANMADIĞI İÇİN KOMBİNE KULLANIM ÖDENMEKTE OLUP REÇETE KARŞILANIRKEN DİKKAT EDİLMELİDİR.</u>	Bu gruptaki ilaçlar; Finasterid (Proscar) veya Dutasterid (Avodart, Dutapros) ile kombinasyonları <u>ödenmektedir.</u>
Tamsulosin (Floprost, Tamidra, Tamprost, Uromax)			
Terazosin (Hytrin, Teranar)			
Doksazosin (Cardura, Doksura, Kardozin)			
Sildosin (Urorec)			

Etken Madde	Geri Ödeme Durumu	UYARI
Finasterid (Proscar)	Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup ilaçlar kombine kullanımda ödenmemektedir	Finasterid (Proscar) veya Dutasterid (Avodart, Dutapros); Alfuzosin (Alfutu, Xalfu, Xatral), Tamsulosin (Floprost, Tamidra, Tamprost, Uromax), Terazosin (Hytrin, Teranar), Doksazosin (Cardura, Doksura, Kardozin)(Cardura, Doksura, Kardozin) veya Sildosin (Urorec) ilaçlarından biriyle kombine kullanımda bedeli <u>ödenmektedir.</u>
Dutasterid (Avodart, Dutapros)		
(Tamsulosin ile olan kombinasyonlarında başka bir BPH ilacıyla sadece BPH tanısıyla kombine kullanımı ödenmemektedir.)		
Serenoa Repens standardize lipofilik ekstresi (Prostagood)	BPH tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla kombine kullanımında kurumca bedeli <u>ödenmemektedir.</u>	

Üriner Antispazmotik ilaçlar

Etken Madde	Geri Ödeme Durumu	UYARI
Solifenasin (Kinzy, Kontifen, Solfesire, Solifas, Soliron, Vesicare, Vesifix, Zevesin)	Nöroloji, Üroloji, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları veya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. (Oral oksibutinine yanıt alınmadığı belirtilmelidir.)	Bu gruptaki ilaçlar kombine kullanımda <u>ödenmemektedir.</u> (Mirabegron-Betmiga kombine kullanımda ödenmektedir.)
Tolterodine-L (Toreda) ,		
Trospiyum (Spasmex, Volterra)		
Darifenasin (Emselex)		
Fesoterodin (Toviaz)		
Propiverin (Eccury, Mictonorm)		
Mirabegron (Betmiga)		
Transdermal Oksibutinin (Kentera)		
Benign Prostat Hiperplazi tedavisinde kullanılan ilaçlar ile Üriner Antispazmotik ilaçların kombine kullanımında bir kısıtlama bulunmamaktadır.		